



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD
310025 ARAD, Bd. Revoluției nr.94-96, tel. 0040/0257/280260,
e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro

FACULTATEA DE MEDICINĂ

ÎNTREBĂRI PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE LICENȚĂ

SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

TESTE DE LICENȚĂ

1.Scopul sondajului este:

- a. evacuarea conținutului
- b. evidențierea cavității conținutului
- c. recoltarea produsului
- d. stabilirea diagnosticului
- e. stabilirea conduitei terapeutice

Răspuns: a, c

2.Incidente și accidente tubajului gastric sunt:

- a. vărsătura și greața
- b. ruperea sondei
- c. hemoragia digestivă
- d. încolăcirea sondei
- e. toate răspunsurile sunt adevărate

Răspuns: a, d

3. Poziția corectă a bolnavului, pentru efectuarea clismei evacuatorii este:

- a. în decubit dorsal
- b. în decubit lateral drept
- c. în decubit lateral stâng, flexia coapsei stângi pe abdomen, iar membrul inferior drept întins
- d. orice poziție confortabilă a bolnavului
- e. decubit lateral drept cu ambele coapse flectate pe abdomen

Răspuns: a, c

4. Scopul sondajului vezical este:

- a. golirea vezicii urinare
- b. efectuarea procedurilor terapeutice
- c. hidratarea vezicii urinare
- d. de a insufla aer în vezica urinară
- e. de a vizualiza interiorul vezicii urinare

Răspuns: a, b

5. Incidentele și accidentele sondajului vezical sunt:

- a. lezarea mucoasei uretrale și vezicale
- b. ruperea sondei vezicale
- c. încolăcirea sondei
- d. crearea de căi false
- e. toate răspunsurile sunt adevărate

Răspuns: a, d

6. Acțiunea unui medicament depinde de:

- a. structura sa chimică
- b. persoana căreia îi este administrată
- c. forma de administrare
- d. doza de administrare
- e. intervalul de timp în care este administrat

Răspuns: a, d, e

7. Injecțiile intramusculare se efectuează în regiunile:

- a. supero-externă a mușchilor fesieri

- b. mușchilor interni ai coapsei
- c. mușchilor posteriori ai coapsei
- d. regiunea externă a deltoidului
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, d

8.Trusa asistentei medicale va cuprinde:

- a. seringi de toate mărimile
- b. stetoscop și tensiometru
- c. termometre
- d. aparat EKG
- e. laringoscop

Răspuns: a, b, c

9.Poziția în pat a bolnavului vârstnic, va fi stabilită de:

- a. medic
- b. și-o alege singur
- c. medic și asistentă, în funcție de afecțiune
- d. și-o alege singur cu acordul medicului
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: b, c, d

10.Compresele reci au acțiune:

- a. hipotermizantă
- b. analgetică
- c. anticoagulantă
- d. antiinflamatoare
- e. antiemetic

Răspuns: a, b, d

11.Efectul căldurii asupra organismului are următoarele acțiuni:

- a. antispastică

- b. calmantă
- c. hipertensivă
- d. scade metabolismul celular
- e. anticoagulant

Răspuns: a, b

12.Factorii declanșanți ai degerăturilor sunt:

- a. frigul
- b. îmbrăcămintea și încălțăminte neadecvată
- c. tratament cu unele medicamente
- d. oboseală
- e. căldura alternând cu frigul

Răspuns: a, b

13.Plăgile mușcate pot fi:

- a. zgârâieturi
- b. înțepături
- c. eritem
- d. flictene
- e. plăgi închise

Răspuns: a, b, e

14.Examenle biologice, în cazul mușcăturii de viperă, arată:

- a. leucocitoză
- b. trombocitopenie
- c. fibrinogen crescut
- d. proteinemie crescută
- e. hipocalcemie

Răspuns: a, b

15.Clinica hiperhidratării se manifestă prin:

- a. delir, halucinații, convulsii

- b. hipotensiune arterială
- c. icter
- d. edeme
- e. semnul pliului prezent

Răspuns: a, d

16.Semnele, de certitudine, ale unei fracturi sunt:

- a. edemațierea segmentului fracturat
- b. sufuziunile sanguine
- c. pozitia anormală a segmentului fracturat
- d. crepitația osoasa
- e. mobilitate normală a segmentului fracturat

Răspuns: c, d

17.Simptomele insolației sunt:

- a. cefalee
- b. fotofobie
- c. hipotensiune arterială
- d. transpirație
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

18.Atelele care fixează fractura, trebuie să îndeplinească următoarele reguli:

- a. să fie solide
- b. să depășească fractura
- c. să cuprindă două articulații
- d. să fie elastice
- e. să fie mobile

Răspuns: a, c

19.Durerea în fracturi se combate prin:

- a. administrarea de analgetice
- b. infiltrații locale și de plex cu analgetice locale

- c. administrare de somnifere
- d. administrare de sedative
- e. administrare de tranchilizant

Răspuns: a, b

20. Aspirația de apă dulce produce:

- a. hemodiluție, în 3 – 4 minute
- b. hipernatremie
- c. hemoliză
- d. fibrilație ventriculară
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

21. Medicația din dulapul de urgență este gestionată direct de:

- a. medic
- b. asistenta șefă
- c. o asistentă destinată pentru acest scop
- d. asistenta de salon
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: b, c

22. Cea mai eficientă de administrare a medicamentelor este:

- a. calea bucală
- b. calea parenterală
- c. prin mucoasa respiratorie
- d. prin injectare intracardiacă
- e. pe sonda de intubație

Răspuns: a, b

23. Un aparat gipsat, incorect aplicat, favorizează:

- a. necroze
- b. paralizii
- c. administrare obligatorie de antibiotice
- d. infecții

e. vindecare prematură

Răspuns: a, b

24.La bolnavul internat în spital, se monitorizează permanent:

- a. TA, circulația, pulsul
- b. respirația, culoarea tegumentelor, temperatura
- c. scaune
- d. poziția în pat în timpul somnului
- e. poziția membrelor

Răspuns: a, b

25.Pregătirea aparaturii medicale de specialitate, o are în sarcină:

- a. medicul
- b. asistenta medicală de salon
- c. asistenta șefă
- d. tehnicianul care o are în service
- e. medicul și tehnicianul care o are în service

Răspuns: b, c

30.Tratamentul local în arsuri îl efectuează:

- a. numai medicul specialist
- b. numai asistenta medicală
- c. medicul împreună cu asistenta medicală, în condiții de asepsie
- d. medicul chirurg, anestezistul și asistenta medicală cu condiția de asepsie perfectă
- e. medicul în condiții de asepsie

Răspuns: c, d

31.Alimentația bolnavului ars cuprinde:

- a. regim bogat în lichide, vitamine, săruri minerale
- b. alimentație mixtă care să cuprindă toate principiile recomandate de medic
- c. nu există restricții alimentare
- d. alimentație bogată în lipide și glucide

e. nici un răspuns nu este corect

Răspuns: a, b

32.În fața bolnavului muribund, asistenta medicală are sarcina:

- a. nu va părăsi nici o clipă bolnavul
- b. părăsește bolnavul numai dacă el dorește
- c. poate părăsi bolnavul dacă el este inconștient
- d. părăsește bolnavul dacă se găsește deasupra resurselor terapeutice
- e. nu are nici o sarcină

Răspuns: a, b

33.Semnele sigure ale decesului sunt:

- a. petele (lividitățile) cadaverice
- b. rigiditatea
- c. oprirea respirației
- d. oprirea circulației
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: c, d

34.Saloanele, în secția de Terapie Intensiva sunt grupate astfel:

- a. saloane septice
- b. saloane aseptice
- c. saloane de postoperator
- d. saloane de preoperator
- e. toate răspunsurile sunt corect

Răspuns: a, b

35.Scopul internării bolnavului, în secția de Terapie Intensiva este:

- a. pentru restabilirea funcțiilor vitale
- b. pentru echilibrarea și stabilizarea hemodinamică, respiratorie și metabolică
- c. pentru a completa tratamentul incomplet efectuat pe alte secții
- d. pentru a stabili diagnosticul corect

e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

36. Bolnavul critic, este internat pe secția Terapie Intensiva pe o perioadă de:

- a. până este compensat hemodinamic și metabolic
- b. până la stabilizarea funcțiilor vitale
- c. numai până la 21 zile
- d. maximum 48 ore
- e. maxim 12 ore

Răspuns: a, b

37. Poziția dorsală a bolnavului în pat, cea mai eficientă și cea mai recomandată, se găsește în afecțiunile:

- a. boli hepatice
- b. pancreatita acută
- c. insuficiența cardiacă
- d. hemoragia digestivă
- e. insuficiența respiratorie

Răspuns: a, b

38. Alimentația la bolnavul hepatic se face:

- a. fracționată în mese mici care să cuprindă kaloriile necesare
- b. fracționată cu mese mici și dese
- c. se face numai endovenos
- d. se administrează numai o masă copioasă pe zi
- e. nu există restricții alimentare

Răspuns: a, b

39. Semnele clinice ale unei hemoragii digestive mari sunt:

- a. paloare, amețeli, cefalee, frisoane
- b. somnolența, adinamie, apatie
- c. neliniște, agitație, hipotensiune, tahicardie
- d. tegumente hiperemice
- e. hipertensiune arterială

Răspuns: a, c

40. Poziția în pat , cea mai indicată a bolnavului pulmonar este:

- a. semișezândă
- b. și-o alege singur
- c. decubit lateral drept
- d. în decubit ventral
- e. decubit lateral stâng

Răspuns: a, b

41. În cazul bolnavilor cardiaci, în criză, până la sosirea medicului, asistenta medicală are voie să administreze:

- a. digoxin
- b. O₂,
- c. Nitroglicerină
- d. analgetic
- e. medicație hipotensoare

Răspuns: b

42. Locul indicat pentru probele de explorări funcționale la bolnavul cardiac este:

- a. în camera de explorări funcționale
- b. în salon
- c. oriunde
- d. în camera de tratamente
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, b

43. Supravegherea bolnavilor renali de către asistenta medicală pretinde urmărirea:

- a. bilanțului hidric
- b. echilibrului acido-bazic
- c. diureza
- d. alimentele ingerate
- e. toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: a, c

44. Pentru dializa peritoneală materialele necesare sunt pregătite de :

- a. medicul nefrolog
- b. asistenta medicală
- c. bolnav, împreună cu asistenta medicală
- d. medic și asistentă
- e. numai de asistenta medicală

Răspuns: b, c

45. Bolile tubului digestiv sunt date de:

- a. factori alimentari și factori infecțioși
- b. factori climatici
- c. factori parazitari sau nervoși
- d. nu se cunoaște exact cauza
- e. factori chimici

Răspuns. a, c, e

47. Poziția cea mai corectă a bolnavului cu pancreatită acută este:

- a. poziția dorsală
- b. poziția antalgică care și-o alege bolnavul
- c. nu există stabilită o poziție
- d. poziție ventrală
- e. poziție semișezândă

Răspuns: a, b

48. Supravegherea bolnavului hepatic presupune:

- a. urmărirea culorii tegumentelor și sclerelor
- b. pruritul, culoarea scaunelor și apariția fetorului hepatic
- c. urmărirea mișcărilor acestuia
- d. urmărirea alimentației bolnavului
- e. urmărirea limbajului

Răspuns: a, b

49.Alimentația bolnavului cardiac va cuprinde:

- a. alimente cu conținut crescut în sodiu
- b. alimente care să cuprindă toți compușii principali ai alimentației
- c. alimente bogate în vitamine și săruri minerale
- d. alimentație hiperglucidică
- e. alimente bogate în grăsimi vegetale

Răspuns: b, c

50.În afecțiunile otice, când pavilionul urechii este afectat, el va fi șters cu:

- a. tamponane sterile de vată sau înmuiate în alcool
- b. tamponane sterile înmuiate în iod
- c. tamponane sterile de vată înmuiate în apă oxigenată
- d. tamponane sterile de vată înmuiate în alcool iodat
- e. tamponane sterile de vată înmuiate în oxicianură de mercur

Răspuns: a, c

51.Saloanele unde se află bolnavi care și-au pierdut parțial sau total vederea, există următoarele particularități:

- a. ușile saloanelor, băilor, wc-urilor, sălilor de tratament sunt deschise
- b. ușa salonului larg deschisă
- c. pragurile ușilor să fie cât mai înalte
- d. poziția mobilierului va fi mereu schimbată
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, b

52.După expirarea perioadei de imobilizare a bolnavului cu infarct miocardic, mobilizarea sa se începe astfel:

- a. în faza incipientă prin mișcări pasive ale extremităților
- b. se începe cu mișcări active ale extremităților
- c. după mișcările pasive urmează mișcările active sub controlul pulsului și tensiunii arteriale
- d. se începe mobilizarea prin exerciții fizice cu efort dozat, sub conducerea asistentului medical
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

53. Bolnavii renali se internează în saloane:

- a. izolate, ferite de frig, călduroase, fără curenți de aer, la temperaturi de $20 - 22C^0$
- b. amplasați la adăpost de infecții
- c. nu necesită izolare, deoarece nu sunt bolnavi contagioși
- d. se internează în saloane mari
- e. în saloane mici

Răspuns: a, b

56. Tratamentul intensiv al șocului, se face corect în următoarele situații:

- a. în cazul în care tratamentul se adresează cauzei declanșatoare
- b. numai când se respectă algoritmul tratamentului șocului
- c. în cazul în care tratamentul respectă etapa evolutivă în care se găsește bolnavul
- d. tratamentul se face numai când bolnavul a ajuns la spital
- e. toate variantele sunt corecte

Răspuns: a, c

57. Îngrijirea bolnavilor arși se face în funcție de:

- a. gradul arsurii, extinderea și localizarea ei
- b. se face numai în funcție de gradul arsurii
- c. vârsta bolnavului, starea generală a lui și procentul de arsură
- d. în funcție de gradul de dotare a spitalului unde este internat
- e. în funcție de temperatura pe care o prezintă bolnavul

Răspuns: a, c

59.* Care din următoarele domenii nu face parte din definirea conceptului de calitate a vieții ?

- a. fizic: simptomele bolii și reacțiile la tratament

- b. psihologic: starea mentală de sănătate pozitivă
- c. spiritual: necesitatea fundamentală a omului de a da un scop și un înțeles vieții
- d. economic: asigurarea condițiilor materiale de existență și tratament
- e. social: calitatea relațiilor interumane

Răspuns: d

60.*Care este metoda, prin care se precizează diagnosticul de malignitate?

- a. metoda imagistică
- b. examenul citologic
- c. examenul histologic
- d. metoda endoscopică
- e. metodele biochimice

Răspuns: c

61.*Riscul de apariție al cancerului după oprirea fumatului:

- a. nu este modificat
- b. este modificat numai după 15 ani
- c. scade în primii 4 ani și rămâne crescut în continuare
- d. devine egal cu populația generală după 10-15 ani
- e. este diminuat numai prin chimioprofilaxie

Răspuns: d

62.*Modificarea regimului alimentar permite o reducere a incidenței cancerelor cu:

- a. cca. 20%
- b. cca. 30%
- c. cca. 40%
- d. cca. 50%
- e. cu 60%

Răspuns: b

63.Care din localizările de mai jos se situează în primele 6 cauze de morbiditate și mortalitate oncologică în țara noastră ?

- a. colon și rect la bărbați

- b. stomac
- c. plămân l
- d. tiroidă la femei
- e. tumoră ORL la femei

Răspuns: a, b, c

64.Perioada de securitate relativă în urmărirea bolnavului oncologic:

- a. începe din momentul primului tratament, dacă acesta a fost radical
- b. urmează primilor 5 ani de după tratament
- c. corespunde diminuării progresive a riscului de deces prin cancer
- d. bolnavul este considerat vindecat și scos din evidență
- e. bolnavul urmează tratament adjuvant intermitent

Răspuns: b, c

65.Reducerea aportului de calorii alimentare și a obezității poate avea un rol profilactic în:

- a. cancerul de corp uterin
- b. cancerul ovarian
- c. cancerul mamar
- d. cancerul gastric
- e. cancerul de prostată

Răspuns: a, c, e

66.Vârsta influențează considerabil apariția și localizarea cancerului. Care din afirmațiile de mai jos sunt adevărate ?

- a. frecvența cancerului crește rapid după 40 ani
- b. frecvența maximă este sub 40 de ani
- c. influența vârstei se manifestă numai la femei
- d. vârsta influențează numai structura pe localizări, nu și frecvența
- e. în țara noastră, mortalitatea oncologică maximă se înregistrează la grupele de vârstă sub 65 ani

Răspuns: a, e

67.*În care din localizările de mai jos nu s-au identificat factori etiologici alimentari?

- a. cancerul gastric
- b. cancerul hepatic primitiv

- c. cancerul renal
 - d. cancerul de rinofaringe
 - e. cancerul de endometru
- Răspuns: c

68. Creșterea consumului de fibre vegetale și fructe poate reduce semnificativ riscul pentru cancer la care din următoarele localizări?

- a. vezica urinară
- b. prostata
- c. stomacul
- d. colonul și rectul
- e. plămânul

Răspuns: c, d, e

69. Pentru care din localizările de mai jos a fost demonstrat rolul cancerigen al virusurilor ?

- a. rinofaringe
- b. tiroidă
- c. col uterin
- d. ficat
- e. plămân

Răspuns: a, c, d

70. Localizările tumorale, pentru care s-a stabilit o cauză hormonală, sunt următoarele:

- a. col uterin
- b. testicol
- c. hipofiză
- d. os
- e. corp uterin

Răspuns: b, d, e

71. Patul de spital trebuie să corespundă următoarelor criterii:

- a. să fie comod și să-i asigure relaxarea
- b. să se poată așeza la marginea patului
- c. partea utilă cu înălțimea de 80cm

- d. partea utilă cu înălțimea de 60cm
- e. să fie accesibil din toate laturile

Răspuns: a, b, d, e.

72. Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

- a. saltele antidecubit
- b. perne pufoase
- c. saltele pneumatice compartimentate
- d. saltele cu apă
- e. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d.

73. Poziția semișezândă a bolnavului în pat este indicată în situații de:

- a. afecțiuni cardiace și pulmonare
- b. după unele intervenții chirurgicale
- c. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
- d. convalescență
- e. colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d.

74. Mobilizarea bolnavilor după ședere îndelungată la pat se efectuează, controlând:

- a. pulsul
- b. tensiunea arterială
- c. frecvența respirației
- d. diureza
- e. curba ponderală

Răspuns: a, b, c.

75. Îngrijirea cavității bucale la bolnavii inconștienți se face cu:

- a. lichid de gargară în cantitate suficientă
- b. tampon îmbibat în glicerină boraxată
- c. pastă de dinți
- d. tampon îmbibat în zeamă de lămâie
- e. albastru de metil

Răspuns: b, d.

76.Poziția forțată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:

- a. reacție de apărare conștientă sau inconștientă a organismului
- b. măsură terapeutică
- c. măsură profilactică
- d. modificări patologice produse de boală
- e. impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d.

77.Factorii favorizanți locali pentru apariția escarelor de decubit pot fi:

- a. umezeală locală (urină, fecale, diverse secreții)
- b. imobilizare în aceeași poziție, timp mai îndelungat
- c. folosirea de pudră de talc
- d. căldură umedă excesivă
- e. neregularități ale lenjeriei de pat și de corp

Răspuns: a, b, d, e.

78.Tratamentul escarelor se efectuează prin:

- a. căldură umedă locală
- b. crearea unui mediu local uscat și cât se poate de steril
- c. medicație locală epitelizantă
- d. aplicări locale de antibiotice și pomezi revulsive
- e. tratament chirurgical

Răspuns: b, c, d, e.

79.Sarcinile asistentului medical în pregătirea și asistarea examinărilor clinice, sunt:

- a. pregătirea psihică a bolnavului
- b. dezbrăcarea și îmbrăcarea bolnavului
- c. deservirea medicului cu instrumentar
- d. purtarea de discuții cu bolnavul, în timp ce îl examinează medicul
- e. așezarea bolnavului în pat după examinare și facerea patului

Răspuns: a, b, c, e.

80.Pentru tușeul rectal, poziția bolnavului poate fi:

- a. șezândă
- b. genu-pectorală
- c. ginecologică (la femei)
- d. decubit lateral, cu coapsele flectate pe abdomen
- e. indiferentă

Răspuns: b, c, d

81.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

- a. scurt istoric al bolii
- b. pulsul
- c. temperatura
- d. tensiunea arterială
- e. diureza

Răspuns: b, c, d, e.

82.Paloarea instalată rapid poate ascunde:

- a. hemoragie masivă urinară (hematurie)
- b. hemoragie ocultă
- c. hemoragie digestivă superioară (hematemeză, melena)
- d. stare febrilă
- e. hemoragie respiratorie (hemoptizie)

Răspuns: a, c, e.

83.Pe foaia de temperatură se menționează cu:

- a. steluță - frisonul
- b. săgeți roșii - transfuziile de sânge sau preparate sanguine
- c. linie roșie întreruptă - temperatura
- d. linie albastră continuă - pulsul
- e. coloane roșii - tensiunea arterială

Răspuns: a, b, e.

84.Măsurarea pulsului la pacientul internat se face :

- a. în repaus fizic și psihic
- b. după efort
- c. pe durata unui minut
- d. în șanțul radier
- e. cel puțin o dată pe zi

Răspuns: a, c, d, e.

85.Produsele biologice normale, ce se pot recolta de la bolnavi, pot fi:

- a. sângele
- b. urina
- c. materiile fecale
- d. lichidul cefalo-rahidian
- e. lichidul de ascită

Răspuns: a, b, c, d.

86.Sângele pentru hemocultură se recoltează :

- a. de obicei seara
- b. în plin frison
- c. după începerea tratamentului antibiotic
- d. la cel puțin 24 ore de la terminarea tratamentului cu antibiotice
- e. indiferent când

Răspuns: b, d.

87.Recoltarea urinii se efectuează:

- a. de obicei dimineața
- b. în vase de sticlă cilindrice, gradate
- c. din urina strânsă în timpul nopții
- d. prin sondaj vezical, dar numai la copii și numai în scop diagnostic
- e. prin punționarea sondei, la bolnavii cu sondă vezicală permanentă

Răspuns: a, b, e.

88. Cavitățile seroase, din care se pot recolta revărsate, pot fi:

- a. stomacul
- b. cavitatea pleurală
- c. cavitatea peritoneală
- d. pericardul
- e. cavitatea articulară

Răspuns: b, c, d, e.

89. Recoltarea de sânge capilar se practică pentru determinarea:

- a. tabloului sanguin
- b. cantitativă a hemoglobinei
- c. numărului de reticulocite
- d. timpului de sângerare și coagulare
- e. sideremiei

Răspuns: a, b, c, d

90. Testele cutanate alergice de diagnostic mai des folosite sunt:

- a. IDR-Mantoux - pentru TBC
- b. IDR-Burnet - pentru bruceloză
- c. IDR-Cassoni - pentru chistul hidatic
- d. Reacția Dick - pentru scarlatină
- e. IDR - pentru trichineloză

Răspuns: a, b, c, e

91. Pregătirea bolnavilor pentru examinarea radiologică înseamnă:

- a. asigurarea temperaturii corespunzătoare bolnavului dezbrăcat
- b. completarea biletului de trimitere de către medic
- c. înștiințarea serviciului de radiologie despre examinarea cerută
- d. transportul bolnavului, însoțit de asistenta de salon și documente medicale
- e. pregătirea psihică a bolnavilor

Răspuns: a, c, d, e

98. Examinarea radiologică a colonului, cu metoda dublului contrast, poate evidenția:

- a. stenoze
- b. polipi
- c. tumori
- d. diverticuli
- e. hernie hiatală

Răspuns: a, b, c, d

99. Pregătirea pentru examinarea ultrasonografică a abdomenului presupune:

- a. administrarea unei medicații absorbante a gazelor
- b. cu cel puțin 24 de ore înainte, bolnavul rămâne nemâncat
- c. pentru examinarea organelor din micul bazin, vezica urinară golită
- d. medicație purgativă, la nevoie
- e. ingerarea a 500-700 ml de lichide, cu 30 minute înainte de examinare

Răspuns: a, d

100. Endoscopia se folosește în examinarea organelor cavitare, cum ar fi:

- a. esofagul
- b. stomacul
- c. rectul
- d. colonul
- e. colecistul

Răspuns: a, b, c, d

101.* Căile de administrare ale medicamentelor pot fi:

- a. în aplicații locale
- b. pe cale bucală
- c. sub formă de injecții
- d. în administrări intracavitare
- e. toate răspunsurile de mai sus

Răspuns: e

102.*Repausul fizic relativ înseamnă că bolnavul:

- a. stă la pat majoritatea timpului, coborând numai pentru necesități personale
- b. se scoală din pat pentru necesități personale și plimbări progresive de recuperare
- c. nu părăsește patul decât în orele de vizită
- d. nu părăsește patul deloc
- e. ține în repaus numai anumite părți ale corpului

Răspuns: b

103.Repausul intelectual se recomandă în:

- a. hepatita acută
- b. cardiopatii
- c. nevroze
- d. fracturi cu imobilizare
- e. psihoze

Răspuns: a, b, c, e

104.Alimentația bolnavului urmărește:

- a. acoperirea cheltuielilor energetice de bază ale organismului
- b. asigurarea aportului de săruri minerale, vitamine și microelemente
- c. câștig ponderal de cel puțin 10% din greutate
- d. favorizarea vindecării
- e. asigurarea principiilor alimentare după toleranța și opțiunea pacientului

Răspuns: a, b, d

105.Necesitățile calorice în repausul absolut la pat sunt de:

- a. 15 calorii/kilo-corp în 24 h
- b. 20 calorii/kilo-corp în 24 h
- c. 25 calorii/kilo-corp în 24 h
- d. cu 10-15% mai mici la bătrâni și la copii
- e. cu 20-30% mai mari în secțiunile de pediatrie

Răspuns: c, e

106.Necesitățile calorice crescute se impun în:

- a. stări febrile, cu 13% pentru fiecare grad de temperatură

- b. distrucții de țesuturi, care necesită un aport caloric suplimentar de 10%
 - c. boli cu metabolism crescut
 - d. cașexia neoplazică
 - e. stări de agitație și/ sau contracții musculare, până la 30%
- Răspuns: a, b, c, e

107.*Regimul alimentar al bolnavului trebuie să asigure următoarele necesități calitative:

- a. hidrați de carbon în cantități nelimitate
- b. proteine de origine animală
- c. vitamine liposolubile
- d. grăsimi de origine vegetală
- e. toate principiile alimentare, în proporție calculată, după necesarul individual (după boală)

Răspuns: e

108.Rolul proteinelor în organism este complex, ele participând la:

- a. sinteza și secreția de hormoni și enzime
- b. reglarea parțială a tensiunii arteriale
- c. acoperirea parțială a nevoilor energetice
- d. buna funcționare a sistemului imunitar
- e. menținerea presiunii coloid-osmotice a sângelui (prevenirea și combatere edemelor)

Răspuns: a, c, d, e

109.Aplicațiile reci au efect:

- a. tonifiant
- b. stimulator
- c. regenerator
- d. anesteziant până la necroză, la sistemul nervos central
- e. antispastic

Răspuns: a, b, c, d.

110.Frigul, sub formă uscată, se poate aplica, ca și:

- a. punși cu gheață prin intermediul unui prosop, flanel

- b. pungi cu gheață direct pe piele, în anumite situații de urgență
 - c. recipiente speciale din cauciuc sau metal
 - d. crioterapie în spasme vasculare, glomerulonefrită acută, infecții urinare
 - e. hidrofoare
- Răspuns: a, c, e.

111.Compresele reci, ca și formă de aplicație umedă, se indică în:

- a. inflamații, edeme
- b. hemoragii
- c. ameliorarea durerilor localizate
- d. hipotermie
- e. stări febrile

Răspuns: a, b, c, e.

112.*Fricțiunile, ca metodă hidroterapeutică, se folosesc în caz de:

- a. afecțiuni inflamatorii cutanate
- b. supurații
- c. reacții alergice
- d. flebite
- e. afecțiuni inflamatorii ale aparatului respirator

Răspuns: e

113.Băile curative parțiale alternante se aplică:

- a. pentru extremități
- b. în două vase: unul cu apă rece de 15-18°C, altul cu apă caldă de 40°C
- c. membrele, prima dată se introduc în apă rece timp de 20-60 secunde, apoi în cea caldă timp de 2-3 min.
- d. în 10-12 ședințe zilnice
- e. de 2-3 ori zilnic, în caz de hemoroizi

Răspuns: a, b

114.Aplicațiile calde înseamnă:

- a. folosirea de temperaturi cu cel puțin 5 grade peste cea indiferentă

- b. obținerea de efecte antispastice
- c. efect hipotensor prin vasodilatație periferică
- d. aplicarea căldurii uscate direct pe țesuturi
- e. comprese fierbinți la 45-55°C

Răspuns: b, c, d, e

115.Cataplasmele umede, cu substanțe păstoase vegetale se aplică în:

- a. infecții ale țesutului celular subcutanat
- b. afecțiuni ORL
- c. mialgii, artralgi, spasme musculare
- d. colecistită acută flegmonoasă
- e. artrite subacute și cronice

Răspuns: a, b, c, e.

116.*Băile calde se folosesc:

- a. sub formă de băi calde obișnuite, la temperatura de 45-50°C
- b. sub formă de băi fierbinți, la temperatura de peste 50°C, cu durata de 60 de minute
- c. în stări febrile
- d. în afecțiuni acute articulare
- e. în hipotermii

Răspuns: e.

117.Petele de mușchi de pe lenjerii se curăță cu:

- a. amoniac
- b. oxalat de sodiu 20%
- c. apă
- d. clor
- e. alcool

Răspuns: a, b, c

118.Petele de gudron se curăță cu:

- a. albastru de metil
- b. aăpun

- c. aterebentină
- d. benzină
- e. alcool

Răspuns: b, c, d, e

119.Petele de fructe se curăță cu:

- a. lapte dulce
- b. soluție de bisulfid de sodiu acidificat cu acid clorhidric
- c. apă
- d. alcool
- e. benzină

Răspuns: a, b, c

120.Petele de iod se curăță cu:

- a. hidroxid de amoniu
- b. tiosulfat de sodiu 10%
- c. apă
- d. vitamina C în soluție
- e. alcool

Răspuns: a, b, d

121.Pentru conservarea materialelor alterabile, frigiderul are rolul de:

- a. a împiedica degradarea acestora
- b. a schimba compoziția acestora
- c. a reduce sau a opri dezvoltarea microorganismelor
- d. a asigura stabilitatea medicamentelor termolabile
- e. a asigura păstrarea vitaminelor în fructe și legume

Răspuns: a, c, d, e

122.Întreținerea frigiderelor din saloane constă din:

- a. dezghețare la 10-20 de zile
- b. se spală tot interiorul cu apă caldă
- c. se lasă deschis să se usuce după spălare
- d. garniturile de etanșizare ale ușii se spală separat
- e. se spală cu alcool

Răspuns: a, b, c, d

123.În lipsa tărgilor, transportul primar al pacienților se poate face cu mijloace improvizate:

- a. scaun cu spătar
- b. pătură
- c. sac de plastic
- d. covor
- e. palton fixat pe bază de lemn

Răspuns: a, b, d, e

124.Transportul secundar și cel în incinta spitalului este obligatoriu la următoarele categorii de bolnavi:

- a. bolnavi în stare de șoc
- b. bolnavi cu stare generală bună
- c. bolnavi suspecți sau confirmați cu infarct miocardic
- d. bolnavi cu afecțiuni ale membrelor inferioare
- e. bolnavi cu insuficiență cardio-pulmonară gravă

Răspuns: a, c, d, e

125.În cursul transportului prematurului, asistenta însoțitoare va urmări în permanență funcțiile vitale ale acestuia:

- a. diureza
- b. respirația
- c. circulația
- d. termoreglarea
- e. pulsul

Răspuns: b, c, d, e

126.Tăvița renală se poate folosi pentru:

- a. colectarea urinei
- b. colectarea materiilor fecale
- c. captarea vărsăturilor
- d. strângerea tamponelor
- e. strângerea instrumentelor întrebuințate

Răspuns: c, d, e

127.*Tuburile de cauciuc și de material plastic se utilizează ca și accesorii pentru diferite dispozitive:

- a. irigatoare
- b. aparate de alimentație artificială
- c. aparate e aspirație a secrețiilor
- d. transfuzii de sânge
- e. toate răspunsurile de mai sus.

Răspuns corect: e

128.Manopere, investigații și tratamente, ce se efectuează în decubit lateral, sunt:

- a. administrarea clismelor și a supozitoarelor
- b. consultul abdominal
- c. puncția lombară
- d. măsurarea temperaturii rectale
- e. sondajul vezical

Răspuns: a, d

129.Dispneea de repaus este o dispnee permanentă, care apare inclusiv în poziția de ortopnee; ea poate avea ca și cauză:

- a. tulburări de reglare centrală
- b. efortul fizic
- c. obstacol în căile respiratorii
- d. tulburări circulatorii
- e. mici sângerări

Răspuns: a, c, d

130.Dispneea de efort apare în:

- a. boli ale aparatului cardio-vascular
- b. anemii
- c. repaus
- d. somn
- e. tumori genitale

Răspuns: a, b.

131.Dispneea inspiratorie apare în:

- a. paralizia incompletă a mușchilor respiratorii
- b. obstacol al căilor respiratorii
- c. postprandial
- d. astm bronșic
- e. pneumonii

Răspuns: a, b, e

132.Poliuria durabilă apare în:

- a. diabet zaharat
- b. deshidratare
- c. stare febrilă
- d. scleroză renală
- e. diabet insipid

Răspuns: a, d, e.

133.Culoarea urinei depinde de:

- a. densitate
- b. cantitate
- c. unele boli
- d. băuturi colorate, acidulate
- e. expunere la soare a pacientului

Răspuns: a, b, c.

134.Medicamente, care schimbă culoarea urinei, sunt:

- a. Furazolidon
- b. Rifampicină
- c. Omeran
- d. Oxacilină
- e. Piramidon, Algocalmin

Răspuns: a, b, e

135.*Vărsături fecaloide apar în:

- a. hepatite
- b. infarct miocardic
- c. ocluzie intestinală
- d. pneumonii
- e. gastrite

Răspuns: c

136.Hematemiza – vărsăturile sangvinolente și de sânge pur se datorează unor:

- a. boli ale stomacului
- b. boli de sânge - coagulopatii
- c. tratamente anticoagulante
- d. pneumonii
- e. TBC pulmonar

Răspuns: a, b, c.

137.Elemente patologice apărute în scaun pot fi:

- a. apă
- b. mucus
- c. puroi
- d. sânge
- e. alimente parțial digerate

Răspuns: b, c, d.

138.Scăderea corporală rapidă apare în cazul:

- a. eliminării edemelor
- b. eliminării ascitei
- c. administrării unor diuretice
- d. după efort fizic
- e. unei diareei severe

Răspuns: a, b, c, e.

139.Se cântăresc zilnic pacienții cu:

- a. insuficiență cardiacă
- b. TBC pulmonar
- c. tratamente cu cortizon
- d. tratamente cu diuretice
- e. sindrom diareic

Răspuns: a, c, d, e

140.*Leucoreea este:

- a. scaun cu sânge
- b. spută purulentă
- c. secreție nazală patologică
- d. secreție vaginală patologică
- e. scurgere sangvinolentă vaginală

Răspuns: d.

141.Paloarea persistentă poate avea ca și cauză:

- a. anemia
- b. icterul
- c. irigația insuficientă cronică a pielii
- d. efortul
- e. bolile consumptive

Răspuns: a, c, e.

142.Roșeața intensă a pielii poate să apară în:

- a. febră
- b. emoții
- c. efort fizic
- d. anemii
- e. șoc hemoragic

Răspuns: a, b, c

143.Erupțiile cutanate se pot întâlni în:

- a. icter
- b. anemii

- c. reacții alergice
- d. boli infecțioase
- e. alergii medicamentoase

Răspuns: c, d, e

144.Sunt considerate mișcări involuntare următoarele:

- a. Miocloniile
- b. torticolisul
- c. tremurăturile
- d. flexia antebrățului
- e. mișcările coreice

Răspuns: a, c, e

145.*Epistaxisul este:

- a. hemoragie vaginală
- b. urină hipercromă
- c. scurgere patologică din cavitatea auriculară
- d. sângerare din cavitatea nazală
- e. sângerarea gingiilor

Răspuns: d

146.*La bolnavii alcoolici, semnul major al abstenenței este:

- a. paloarea
- b. roșeața
- c. tremurăturile grosolane, generalizate
- d. transpirații
- e. setea

Răspuns: c

147.*Intradermoreacția se efectuează:

- a. pe suprafața de flexie a antebrățului
- b. pe zona fesieră

- c. pe pielea păroasă a capului
- d. pe lobul urechii
- e. pe tegumente abdominale

Răspuns: a.

148.Examinarea radiologică a colonului se efectuează prin:

- a. irigografie
- b. endoscopie
- c. Rx nativ
- d. tușeu rectal
- e. laparotomie

Răspuns: a, c

149.Examenul radiologic al rinichilor se poate efectua prin:

- a. radiografie simplă
- b. urografie
- c. pielografie ascendentă
- d. ecografie
- e. pasaj baritat

Răspuns: a, b, c

150.*Cu ajutorul bronhoscopului se poate examina:

- a. stomacul
- b. rinichii
- c. bronșiile
- d. esofagul
- e. laringele

Răspuns: c.

151.Rectul se examinează cu:

- a. laringoscop

- b. rectoscop
- c. bronhoscop
- d. tușeu rectal
- e. specul vaginal

Răspuns: b, d

152. Pentru efectuarea colposcopiei este necesară:

- a. masă ginecologică
- b. colposcop
- c. soluție lugol
- d. substanță de contrast
- e. soluție de acid acetic 3%

Răspuns: a, b, c, e

153.*Principiul echității în activitatea de nursing comunitar se referă la:

- a. nediscriminarea între pacienți;
- b. doar îngrijiri medicale;
- c. îngrijiri medicale și sociale;
- d. îngrijiri în sisteme de asigurări private;
- e. îngrijiri la domiciliu.

Răspuns: a

154. Nursingul comunitar are drept domeniu furnizarea de servicii de îngrijiri către:

- a. pacienți în mod individual;
- b. populație sănătoasă;
- c. pacienților din clinici;
- d. pacienți din centre medicale;
- e. elevi.

Răspuns: a, b, c, d, e

155. Elementele de îngrijire acordate de asistenței comunitari sunt:

- a. menținerea funcțiilor vitale;
- b. diagnosticul medical al afecțiunilor cronice;

- c. optimizarea somnului și odihnei;
- d. diagnosticul medical al afecțiunilor acute;
- e. procurarea hranei pacienților.

Răspuns: a, c

156. Activitatea asistenților comunitari este ghidată de următoarele principii:

- a. echitate;
- b. etică;
- c. cooperare internațională;
- d. remunerație;
- e. cerere-ofertă.

Răspuns: a, b

157. În luarea unor decizii etice, asistenții comunitari trebuie să urmărească:

- a. colectarea datelor;
- b. ierarhizarea priorităților;
- c. clasificarea socială a pacienților;
- d. atitudinea familiei;
- e. dovedirea statutului de asigurat.

Răspuns: a, b

158. Principiile avute în vedere de către asistenții comunitari în procesul de îngrijiri sunt:

- a. principiul beneficiului;
- b. principiul autonomiei;
- c. principiul calității;
- d. principiul perfecționării continue a cunoștințelor;
- d. principiul socializării.

Răspuns: c, d

159. Asistenții comunitari au rol în:

- a. îngrijirea primară;
- b. rezolvarea în mod independent a urgențelor medicale;
- c. îngrijirea pe termen lung;

- d. rezolvarea unor probleme juridice ale pacienților;
- e. intermedierea conflictelor din familiile pacienților.

Răspuns: a, c

- 160.***Responsabilitățile generale ale asistenților comunitari în îngrijirile a. primare de sănătate sunt:
- b. diagnosticul medical al bolii acute;
 - c. prevenirea complicațiilor;
 - d. tratamentul bolii identificate;
 - d. modificarea tratamentului în absența unor rezultate satisfăcătoare;
 - e. diagnosticul medical al bolii cronice și prescrierea tratamentului.

Răspuns: b

- 161.**Responsabilitățile medicale ale asistenților comunitari în îngrijirile primare de sănătate sunt:
- a. supravegherea stării de sănătate a gravidei, lăuzei, sugarului;
 - b. diagnosticarea și tratarea bolilor acute;
 - c. prescrierea unor regimuri alimentare specifice vârstei și afecțiunii pacientului;
 - d. prevenirea complicațiilor;
 - e. internarea în spital a pacienților.

Răspuns: a, d

- 162.**Manifestările de dependență identificate de asistenții comunitari (semne sau simptome) în tulburările gândirii sunt:
- a. fuga de idei;
 - b. halucinațiile;
 - c. furia;
 - d. incoerența în vorbire;
 - e. coma.

Răspuns: a, d

- 163.**Tulburările afective ale pacienților pot fi:
- a. furia;
 - b. amnezia;
 - c. apatia;
 - d. logoreea;

e. sașietatea.

Răspuns: a, c

164.Tulburările activității motorii sunt:

- a. restrângerea activității;
- b. lentoarea ideativă;
- c. fuga de idei;
- d. agitația motorie;
- e. debilitatea mentală.

Răspuns: a, d

165.Tulburările inteligenței sunt:

- a. coma;
- b. debilitatea mentală;
- c. retardul mental;
- d. imbecilitatea;
- e. agitația psihomotorie.

Răspuns: b, c, d

166.Problemele posibile ale femeii gravide în primul trimestru de sarcină sunt:

- a. grețuri;
- b. vărsături;
- c. semne de fals travaliu;
- d. dispariția ciclului menstrual;
- e. travaliul adevărat.

Răspuns: a, b, d

167.Obiectivele activității asistenților comunitari pentru femeia gravidă sunt:

- a. să cunoască toate modificările ce apar în timpul sarcinii;
- b. să fie informată despre adaptările corpului său la sarcină;
- c. igiena corporală a nou-născutului;
- d. să primească toate informațiile cu privire la naștere și travaliu;
- e. internarea în Maternitate.

Răspuns: a, b, d

168.Obiectivele asistențelor comunitari în îngrijirea sugarului sunt:

- a. îngrijirea corporală;
- b. diagnosticul medical al bolilor acute;
- c. recomandări de alimentație;
- d. instruirea mamei;
- e. diagnosticul medical al bolilor cronice.

Răspuns: a, c, d

169.Obiectivele esențiale ale îngrijirii sugarului sunt:

- a. asistența efectivă;
- b. alimentația;
- c. călirea organismului;
- d. profilaxia rahitismului;
- e. procurarea lenjeriei.

Răspuns: a, c, d

170.Care dintre următoarele situații pot fi considerate contraindicații ale vaccinării:

- a. hipersensibilitate cunoscută;
- b. copii cu antecedente de boli acute;
- c. copii cu SIDA sau HIV;
- d. dezordini imunitare;
- e. starea de sănătate.

Răspuns: a, c, d

171.*Simptomele cognitive ale demențelor sunt:

- a. agitația;
- b. tulburări de memorie;
- c. tulburări de limbaj;
- d. tulburări de dispoziție;
- e. coma.

Răspuns: b

172. Calea de administrare a vaccinurilor poate fi:

- a. intradermic;
- b. intravenos;
- c. intramuscular;
- d. oral;
- e. intraauricular.

Răspuns: a, c, d

173. Rolul asistenților comunitari în trimestrul III de sarcină este să instruiască gravida în scopul:

- a. recunoașterii semnelor ce prevestesc nașterea;
- b. recunoașterii semnelor de sarcină;
- c. ameliorării anxietății;
- d. recunoașterea semnelor de debut ale travaliului;
- e. sarcinilor ulterioare.

Răspuns: a, c, d

174. La pacienții preșcolari și școlari asistenții comunitari urmăresc:

- a. dezvoltarea somatică;
- b. prevenirea accidentelor;
- c. dezvoltarea psihică;
- d. performanțele școlare;
- e. prezența la programul de studiu.

Răspuns: a, b, c

200. Hemoptizia se manifestă prin:

- a. sânge cu resturi alimentare;
- b. sânge aerat;
- c. anamneză pentru afecțiuni respiratorii;
- d. sânge roșu, proaspăt;
- e. sânge negru coagulat.

Răspuns: b, d

201. Criza de astm bronșic se manifestă prin:

- a. dispnee cu caracter expirator;
- b. dispnee cu caracter inspirator;
- c. tuse cu expectorație perlata;
- d. stare prodromală
- e. anurie.

Răspuns: a, c, d

202. Intervenția asistenților comunitari la bolnavul cu astm bronșic vizează:

- a. ajutarea pacientului pentru satisfacerea nevoilor fundamentale;
- b. hidratarea corespunzătoare a bolnavului;
- c. prescrierea tratamentului corespunzător simptomelor;
- d. educația pacientului privind prevenirea crizelor de astm;
- e. recomandarea perfuziei endo-venoase.

Răspuns: a, b, d

203. Manifestările clinice ale pneumoniei pneumococice sunt:

- a. leucocitoză cu neutropenie;
- b. frison unic solemn;
- c. junghi toracic;
- d. febră;
- e. VSH crescut.

Răspuns: b, c, d

204. *Modificările clinice prezente în pneumonia bacteriană acută sunt:

- a. ASLO crescut;
- b. starea generală alterată;
- c. radiografie toracică cu modificări;
- d. examen spută cu pneumococi, streptococi;
- e. VSH creacut.

Răspuns: b

205.Obiectivele îngrijirii bolnavului cu pneumonie bacteriană acută sunt:

- a. combaterea infecției;
- b. cronicizarea lentă a bolii;
- c. îmbunătățirea respirației;
- d. prevenirea complicațiilor;
- e. vaccinarea obligatorie antipneumococică.

Răspuns: a, c, d

206.Intervențiile asistenților comunitari în pneumonia bacteriană acută sunt:

- a. umidificarea aerului;
- b. monitorizarea funcțiilor vitale;
- c. administrarea tratamentului medicamentos prescris;
- d. imobilizarea bolnavului la pat pe perioada bolii;
- e. comunicarea prognosticului bolii.

Răspuns: a, b, c

207.Circumstanțele de apariție a pleureziilor sunt:

- a. afecțiuni pulmonare;
- b. reumatism articular acut;
- c. hepatite acute virale;
- d. traumatismele;
- e. expunerea la radiațiile ultraviolete.

Răspuns: a, b, d

208.Asistența comunitară se adresează următoarelor categorii de persoane:

- a. cu dizabilități și boli cronice;
- b. cu nivel economic sub pragul sărăciei;
- c. salariaților cu asigurare medicală;
- d. su nivel educațional scăzut;
- e. nici una dintre aceste categorii.

Răspuns: a, b, d

209.Care dintre următoarele tipuri de criză pot fi identificate de asistenții comunitari:

- a. criza maturațională;
- b. criza situațională;
- c. criza catastrofică;
- d. criza socială;
- e. criza morală.

Răspuns: a, b, d

210.Care dintre următoarele activități pot fi cuprinse în stadiul de previzită la domiciliu pacientului:

- a. contactul social;
- b. pregătirea echipamentului necesar;
- c. efectuarea de rapoarte despre cazul investigat;
- d. îndepărtarea echipamentului contaminat;
- e. îndepărtarea reziduurilor menajere.

Răspuns: a, b, d

211.Pentru prevenirea escarelor se pot utiliza:

- a. saltele antidecubit
- b. perne pufoase
- c. saltele pneumatice compartimentate
- d. saltele cu apă
- e. nu necesită măsuri de prevenire speciale

Răspuns: a, c, d

212.Poziția semișezândă a bolnavului în pat este indicată în situații de:

- a. afecțiuni cardiace și pulmonare
- b. după unele intervenții chirurgicale
- c. bolnavi vârstnici, pentru prevenirea pneumoniei hipostatice
- d. convalescență
- e. colaps vascular

Răspuns: a, b, c, d

213.Mobilizarea bolnavilor după ședere îndelungată la pat se efectuează controlând:

- a. pulsul
- b. tensiunea arterială
- c. frecvența respirației
- d. diureza
- e. curba ponderală

Răspuns: a, b, c

214.Îngrijirea cavității bucale la bolnavii inconștienți se face cu:

- a. lichid de gargară în cantitate suficientă
- b. tampon imbibat în glicerina boraxată
- c. pastă de dinți
- d. tampon imbibat în zeamă de lămâie
- e. albastru de metil

Răspuns: b, d

215.Poziția forțată a bolnavului în pat poate avea următoarele cauze:

- a. reacție de apărare conștientă sau inconștientă a organismului
- b. măsură terapeutică
- c. măsură profilactică
- d. modificări patologice produse de boală
- e. impusă de personalul medical de îngrijire

Răspuns: a, b, c, d

216.Factorii favorizanți locali pentru apariția escarelor de decubit pot fi:

- a. umezeală locală (urina, fecale, secreții diverse)
- b. imobilizare în aceeași poziție timp mai îndelungat
- c. folosirea de pudră de talc
- d. căldură umedă excesivă
- e. neregularități ale lenjeriei de pat și de corp

Răspuns: a, b, d, e

217.Panglica metrică este utilizată pentru măsurarea:

- a. circumferința toracelui
- b. circumferința capului la vârstnici

- c. lungimea brațelor la sugari
- d. circumferința abdominală
- e. circumferința membrelor

Răspuns corect: a, d, e

218.Foarfecele folosite în domeniul sanitar pot fi:

- a. drepte
- b. curbe
- c. semicurbe
- d. frînte
- e. rotunjite

Răspuns corect: a, b, d

219.Pe foaia de temperatură se notează obligatoriu:

- a. scurt istoric al bolii
- b. pulsul
- c. temperatura
- d. tensiunea arterială
- e. diureza

Răspuns: b, c, d, e

220.Paloarea instalată rapid poate ascunde:

- a. o hemoragie masivă urinară (hematurie)
- b. o hemoragie ocultă
- c. o hemoragie digestivă superioară (hematemeza, melenă)
- d. stare febrilă
- e. o hemoragie respiratorie (hemoptizie)

Răspuns: a, c, e

221.*Fricțiunile, ca metoda hidroterapeutică, se folosesc în caz de:

- a. afecțiuni inflamatorii cutanate
- b. supurații
- c. reacții alergice
- d. flebite
- e. afecțiuni inflamatorii ale aparatului respirator

Răspuns: e

222. Aplicațiile calde înseamnă:

- a. folosirea de temperaturi cu cel puțin 5 grade peste cea indeferentă
- b. obținerea de efecte antispastice
- c. efect hipotensor prin vasodilatație periferică
- d. aplicarea căldurii uscate direct pe țesuturi
- e. comprese fierbinți la 45-55 °C

Răspuns: b, c, d, e

223. Cataplasmele umede cu substanțe pastoase vegetale se aplică în:

- a. infecții ale țesutului celular subcutanat
- b. afecțiuni ORL
- c. mialgii, artralгии, spasme musculare
- d. colecistita acută flegmonoasă
- e. artrite subacute și cronice

Răspuns: a, b, c, e

224. Parametrii vitali care se urmăresc la bolnavul critic sunt:

- a. TA și alura ventriculară
- b. gradul de inteligență
- c. starea de conștiență
- d. respirația
- e. imagistica organelor vitale

Răspuns: a, c, d

225. Factorii care modifică valorile TA sunt:

- a. condițiile de cazare din spital necorespunzătoare
- b. cardio-vasculari
- c. renali

- d. peristaltica intestinală
- e. umorali

Răspuns: b, c, e

226.În funcție de vârstă valorile normale ale frecvenței pulsului, variază în felul următor:

- a. nou născut 130-140b/min.
- b. copil mic 120-140b/min.
- c. la 10 ani 80-90 b/min.
- d. la 20 ani 60-80 b/min.
- e. peste 60 ani 72-84 b/min.

Răspuns: a, d, e

227.În mod fiziologic pulsul se accelerează în următoarele situații:

- a. în timpul somnului
- b. în efort fizic
- c. în timpul digestiei
- d. când bolnavul este sedat
- e. în stres cu emoții

Răspuns: b, c, e

228.Măsurarea temperaturii corpului se face cu:

- a. termometru termoelectric
- b. termometru termomecanic
- c. termometru cu rezistență
- d. termometru termostatic
- e. termisoare

Răspuns: a, c, e

229.După gradul de hipertermie măsurată, în axilă reacția febrilă se împarte în următoarele categorii:

- a. temperatura normală 36-37°C
- b. temperatură subfebrilă 36,9-37°C
- c. temperatură moderată 37-38°C
- d. febră ridicată 39-41°C

e. hiperpirexie 41-42°C

Răspuns: a, d, e

230.În cazul vărsăturilor se vor urmări:

- a. frecvența
- b. conținutul
- c. ritmul
- d. cantitatea
- e. alimentele

Răspuns: a, b, d

231.Expectorația poate fi:

- a. seroasă
- b. sero-muco-purulentă
- c. bilioasă
- d. pseudomembranoasă
- e. limfatică

Răspuns: a, b, d

232.Greutatea corporală apreciază și indică:

- a. cantitatea de apă existentă în organism
- b. starea de nutriție
- c. stabilirea dozei terapeutice de medicamente
- d. evoluția bolnavului
- e. ritmul perfuziei

Răspuns: b, c, d

233.Monitorizarea comportamentului bolnavului se face prin urmărirea:

- a. poziției vicioase în pat în funcție de afecțiune
- b. activitatea zilnică a bolnavului
- c. expresia feței
- d. activitatea verbală
- e. starea psihică

Răspuns: a, c, e

234. Diagnosticul clinic al stopului cardiac ar fi susținut de:
- a. dispariția pulsului la arterele mari (carotidă, femurală)
 - b. complexe QRS deformate sau disociație electromecanică sau lipsa activității electrice pe EKG
 - c. mioză bilaterală
 - d. oprirea respirației care este precedată de suspine
 - e. starea de letargie

Răspuns: a, b, d

235. Succesul resuscitării cardio-respiratorie-cerebrală (R.C.R.C) constă în:
- a. viteza efectuării terapiei de resuscitare
 - b. R.C.R.C să se efectueze în maxim 4 minute
 - c. terapia definitivă în 8 minute
 - d. să existe minim 3 resuscitatori
 - e. să se efectueze numai de cadre medicale

Răspuns: a, b, c

236. Resuscitarea cardio-respiratorie presupune:
- a. tehnici care se referă personalului medical
 - b. tehnici de management definitive ale stopului cardiac
 - c. intervenție farmacologică
 - d. tehnici care se referă personalului nemedical
 - e. numai tehnici electronice de resuscitare

Răspuns: a, b, c

237. Starea terminală presupune decompensarea acută a funcțiilor vitale care duc la:
- a. pierderea presiunii sanguine
 - b. capitalului venos
 - c. conștienței
 - d. capitalului arterial
 - e. circulației și respirației

Răspuns: a, c, e

238.Moartea clinică se manifestă prin:

- a. absența pulsului periferic
- b. absența respirației
- c. absența pulsului la arterele mari
- d. petele cadaverice
- e. necroza ireversibilă a creierului

Răspuns: b, c, d

239.Etiologia infarctului miocardic (I.M.) acut este:

- a. embolia arterelor coronare
- b. dezechilibru între cerințe și aport de O₂
- c. afecțiuni hepatice
- d. procese inflamatorii
- e. intoxicație cu alcool

Răspuns: a, b, d

240.Majoritatea I.M. (infarct miocardic) survin în orele de dimineață (jurul orei 9) deoarece:

- a. cresc catecolaminele plasmatic
- b. scad catecolaminele plasmatic
- c. crește nivelul cortizolului
- d. scade nivelul cortizolului
- e. crește agregarea trombocitară

Răspuns: a, c, e

241.Durerea simptomul principal în I.M., este variabilă ca intensitate de la caz la caz și are următoarele caracteristici:

- a. insuportabilă
- b. scurtă 1-2 minute
- c. sfâșietoare
- d. presiune ușoară
- e. caracter de înjunghiere

Răspuns: a, c, e

242.Sediul și iradierea durerii în I.M. este:

- a. interscapular
- b. precordial
- c. lombar
- d. iradiază în brațe
- e. paraombilical

Răspuns: a, b, d

243.Tabloul clinic al I.M. se caracterizează prin:

- a. agitație psihomotorie
- b. șoc
- c. hipertensiune arterială
- d. tegumente reci și umede
- e. tahicardie

Răspuns: b, d, e

244.Modificările aparatului respirator în I.M. se caracterizează prin:

- a. frecvența respirațiilor scăzută
- b. frecvența respirațiilor crescută
- c. dispnee cu respirație Cheyne-Stokes
- d. dispnee cu respirație Biot
- e. raluri umede crepitante și subcrepitante

Răspuns: b, c, e

245.Examenul aparatului digestiv în I.M. relevă:

- a. splenomegalie
- b. durere epigastrică
- c. HDS (hemoragie digestivă superioară)
- d. hepatomegalie
- e. reflux hepato-jugular

Răspuns: b, d, e

246.OMS a impus pentru diagnosticul cert de I.M. să fie prezente 2 din cele 3 criterii specifice. Care sunt cele 3 criterii?

- a. durere retrosternală tipică
- b. modificări EKG în dinamică
- c. hepatomegalie
- d. reflux hepato-jugular
- e. creșterea și scăderea markerilor serici

Răspuns: a, b, e

247.Explorarea izotopică în I.M. evidențiază:

- a. diagnosticul pozitiv al necrozei miocardice acute cu ajutorul traserilor radioactivi cu tropism pentru țesutul necrotic (pată fierbinte)
- b. performanța ventricolelor
- c. diagnosticul unor complicații
- d. apreciază regurgitarea mitrală și tricuspidă
- e. arată circulația colaterală

Răspuns: a, b, c

248.Ecografia Doppler în I.M. apreciază:

- a. pereții ventricolului stâng în plan longitudinal
- b. ruptura septului interventricular
- c. regurgitarea mitrală și tricuspidă
- d. diagnosticul unor complicații
- e. prezența trombilor în ventricol

Răspuns: b, c, e

249.Rezonanța magnetică în I.M. pune în evidență:

- a. mărimea infarctului
- b. circulația colaterală
- c. funcția ventricolului stâng
- d. prezența trombilor în ventricol
- e. regurgitarea mitrală și tricuspidă

Răspuns: a, b, c

250.Măsurile rapide care se iau în I.M. în faza prespital sunt:

- a. se anunță salvarea cu echipa antișoc
- b. se administrează diazepam

- c. se așează bolnavul în repaus absolut
- d. nifedipină sublingual
- e. se transportă bolnavul după ce a fost stabilizat hemodinamic la spital unde tratamentul de urgență se face după un algoritm prestabilit

Răspuns: a, c, e

251.Tratamentul bolnavului cu I.M. la spital se efectuează cu:

- a. diuretice
- b. analgetice majore
- c. oxigenoterapie + heparinoterapie
- d. tromboliza coronariană cu streptokinază în primele 6 ore în perfuzii i.v.
- e. fenobarbital

Răspuns: b, c, d

252.Complicațiile I.M. sunt:

- a. hipertensiunea arterială
- b. abdomenul acut
- c. șocul cardiogen
- d. tulburările de ritm cardiac
- e. insuficiența ventriculară stângă

Răspuns: c, d, e

253.Etiologia IM este:

- a. utilizarea drogurilor simpaticolitice
- b. feocromocitomul
- c. obezitatea
- d. eclampsia
- e. stresul

Răspuns: b, d, e

254.Tabloul clinic al HTA se caracterizează prin următoarele simptome:

- a. presiunea arterială sistolică $>140\text{mmHg}$
- b. hipoaldosteronism

- c. modificări renale: oligurie, hematurie, azotemie, proteinurie
- d. modificări ale fundului de ochi (F.O.), hemoragii, edeme, exudate
- e. agitație psihomotorie

Răspuns: a, c, d

255.Tratamentul HTA se face cu :

- a. meprobamat
- b. nifedipină
- c. metoprolol
- d. digoxin
- e. nitroglicerină

Răspuns: b, c, e

256.Poziția corectă în pat a bolnavului cu insuficiență cardiacă este:

- a. semișezândă
- b. Trendelenburg
- c. decubit lateral stâng
- d. așezat pe marginea patului cu picioarele atârnat
- e. și-o alege cum dorește, nu i se impune

Răspuns: a, d, e

257.Alimentația bolnavului cardiac cuprinde:

- a. toți compușii principali alimentari plus vitamine și minerale
- b. aport scăzut de potasiu
- c. numai două mese/zi
- d. mese mici și dese
- e. nu se administrează alimente care produc distensie abdominală

Răspuns: a, d, e

258.În lipsa tărgilor pentru transportul primar al bolnavilor se pot improviza și alte mijloace:

- a. bare de fier
- b. scaune cu spătare

- c. pături, covoare fixate pe bare de lemn
- d. băncuțe
- e. aripile ușilor

Răspuns: b, c, e

259.Mijloacele de transport al bolnavilor vor fi dotate cu:

- a. masă de operație
- b. electrocauter pentru hemostază
- c. aparate de respirație artificială și oxigen
- d. defibrilatoare
- e. trusă de urgență și medicamente

Răspuns: c, d, e

260.Transportul secundar al unui bolnav se referă la:

- a. transportul bolnavului dintr-un spital în altul
- b. transportul bolnavului de la domiciliu la spital
- c. transportul bolnavului intersecției
- d. transportul bolnavului din autosanitară în UPU
- e. transportul bolnavului din spital la domiciliu

Răspuns: a, c, e

261.Măsurile de siguranță pentru bolnav care se iau în timpul transportului interspitalicesc pentru prevenirea complicațiilor sunt:

- a. se va verifica hemostaza
- b. se va verifica starea de conștiență
- c. pansamentele și aparatele de imobilizare
- d. documentele medicale
- e. documentele personale ale bolnavului

Răspuns: a, c, d

262.Transportul intersecției se face de către brancardieri însoțiți de personal medical și cuprinde obligatoriu următoarele categorii de bolnavi:

- a. toți bolnavii care au suferit o fractură
- b. insuficiența cardio-respiratorie gravă

- c. bolnavii cu afecțiuni renale
- d. bolnavii cu infarct miocardic
- e. bolnavii cu tulburări de echilibru și tulburări nervoase

Răspuns: b, d, e

263.Transportul nou-născuților și a sugariilor se face numai cu însoțitor și pentru următoarele afecțiuni:

- a. boală diareică
- b. febrili
- c. cu afecțiuni respiratorii și cardiace
- d. septicemii
- e. cu afecțiuni chirurgicale care necesită intervenție chirurgicală

Răspuns: c, d, e

264.În comă se păstrează în mod relativ funcțiile vieții vegetative și anume:

- a. deglutiția
- b. respirația
- c. circulația
- d. schimburile nutritive și secrețiile
- e. auzul

Răspuns: b, c, d

265.Tabloul clinic al șocului anafilactic se manifestă prin:

- a. hipertensiune arterială
- b. mioză
- c. urticarie generalizată + edeme
- d. edem glotic + spasm glotic
- e. incontinență urinară + fecale

Răspuns: c,d,e

266.Semnele clinice ale șocului hemoragic sunt:

- a. tegumente și mucoase palide, marmorate, reci, umede, cianotice
- b. bradipnee
- c. PVC (presiune venoasă centrală) crescută

- d. tahicardie + hipotensiune
- e. sete

Răspuns: a,d,e

267.Soluțiile cristaloide sunt:

- a. dextranul
- b. serul fiziologic 9‰
- c. soluțiile de glucoză 5%, 10%...
- d. reomacrodexul
- e. soluția Ringer

Răspuns: b, c, e

268.Caracterul durerii în abdomenul acut se caracterizează prin:

- a. durere abdominală intensă
- b. instalarea durerii brusc
- c. durerea are o durată de câteva ore până la 2-3 zile
- d. durerea abdominală instalată lent apoi brusc
- e. durerea abdominală prezintă 2-3 ore după care cedează

Răspuns: a,b,c

269.Semnele clinice în apendicita acută sunt:

- a. durerea apare în primul rând periombilical sau în epigastru apoi după câteva ore se localizează în fosa iliacă dreaptă
- b. manevra Blumberg pozitivă
- c. grețuri și vărsături
- d. durerea iradiază în membrul inferior drept
- e. constipație (mai des la copii)

Răspuns: a,b,c

270.Simptomatologia ocluziei intestinale este:

- a. durere abdominală colicativă cu mici pauze de 10-15 minute
- b. oprirea tranzitului intestinal pentru gaze și materii fecale
- c. deshidratare globală
- d. hemoragie digestivă
- e. fibrilație atrială

Răspuns: a,b,c

271.Semnele clinice ale pancreatitei acute necrotico-hemoragică sunt:

- a. convulsii
- b. vărsături bilioase, apoase, în zaț de cafea sau sânge proaspăt
- c. tranzit intestinal accelerat
- d. abdomen meteorizat, balonat
- e. hipotensiune arterială sau chiar prăbușirea ei

Răspuns: b,d,e

272.Semnele clinice pentru stabilirea diagnosticului de colica biliară sunt:

- a. astenie marcată
- b. durere în hipocondrul drept și epigastru (semnul Murphy pozitiv)
- c. tranzit intestinal accelerat
- d. sindrom dispeptic
- e. cefalee

Răspuns: b,d,e

273.Factorii multipli, dificili care împiedică de multe ori salvarea unui politraumatizat sunt:

- a. debutul brusc al evenimentelor
- b. voluntari necalificați care intervin cu bună intenție la locul accidentului, dar nu au cunoștințe medicale
- c. severitatea și varietatea leziunilor
- d. personal medical de urgență care nu cunoaște manevrele de resuscitare
- e. absența medicamentelor și materialelor sanitare din autosanitară

Răspuns: a,b,c

274.Bolile care produc moartea subită sunt:

- a. bolile coronariene
- b. insuficiență renală

- c. insuficiență cardiacă
- d. instabilitate neuroumorală
- e. tulburările hidroelectrolitice

Răspuns: a,d,e

275.*În bronșita cronică principalul simptom este:

- a. tusea și expectorația
- b. durerea precordială
- c. durerea toracică
- d. frisonul
- e. astenia

Răspuns: a

276.*Debutul pneumoniei pneumococice este marcat de:

- a. frison solemn urmat de junghi toracic și febră
- b. pleurezie
- c. wheezing-ul respirator
- d. hemoptizia
- e. dispneea paroxistică expiratorie

Răspuns: a

277.*Tratamentul crizei de angină pectorală începe cu:

- a. administrarea de Nitroglicerină sublingual
- b. efectuarea testului de efort
- c. tratament perfuzabil cu clorura de potasiu
- d. administrarea de antibiotice
- e. administrarea de Miofilin

Răspuns: a

278.*În hipertensiunea arterială regimul alimentar prescris este:

- a. hiposodat
- b. bogat în grăsimi animale
- c. cu un număr mare de calorii
- d. cu un număr mare de glucide
- e. hipersodat

Răspuns: a

353.Pneumonia poate fi diagnostică la vârstnici prin :

- a. alterarea stării generale
- b. anorexie
- c. confuzie
- d. tahicardia și tahipnee
- e. poliurie

Răspuns: a, b, c, d

354.Hemoptizia poate sugera următoarele afecțiuni:

- a. Bronșita acută
- b. neoplasm pulmonar,
- c. TBC pulmonar avansat
- d. bronhopneumonie
- e. astm bronșic

Răspuns: b, c

355.Dispneea instalată progresiv poate să apară în:

- a. Pleurezii
- b. pneumonii
- c. aspirarea de corpi străini în căile respiratorii
- d. tromboembolismul pulmonar
- e. pneumotorax

Răspuns: a, b

356.Cauzele edemelor simetrice ale membrilor inferioare pot fi:

- a. staza venoasă cronică
- b. sindroamele de compresiune intra abdominală
- c. limfedemul cronic
- d. hipoproteinemii severe
- e. tromboflebită profundă de gambă

Răspuns: a, b, c, d

357.Tratamentul nefarmacologic al TA (prin măsuri igienodietetice) este indicat:

- a. la toți pacienții hipertensivi,
- b. la cei cu istoric familial de hipertensiune
- c. cei cu hipertensiune de graniță
- d. doar la hipertensivi
- e. doar la cei cu hipertensiune de graniță

Răspuns: a, b, c

358.Ortopneea se caracterizează prin faptul ca:

- a. apare când bolnavul este culcat
- b. pacientul sta la marginea patului cu sete de aer
- c. apare insuficiența ventriculară stângă
- d. apare în timpul efortului
- e. apare după efort

Răspuns: b, c

363.Criza de astm bronșic este definită de:

- a. accese de dispnee bradipneica expiratorie
- b. wheezing
- c. tuse spastică sau cu expectorație aderentă, perlata
- d. caracterul reversibil al episodului de dispnee
- e. aspect radiologic de condensare pulmonară

Răspuns: a, b, c, d

364. Stabilirea volumului diurezei este important pentru:

- a. stabilirea rației calorice
- b. stabilirea bilanțului hidric
- c. evaluarea funcțională a aparatului renal
- d. determinarea sedimentului urinar
- e. evaluarea morfo-funcțională a aparatului digestiv

Răspuns: b, c

365. Precizați care afirmație este adevărată:

- a. dezinfectia tegumentelor se efectuează înainte de puncția venoasă
- b. dezinfectia tegumentelor se efectuează în timpul puncției venoase
- c. dezinfectia tegumentelor se efectuează după puncția venoasă
- d. garoul se aplică înainte de puncția venoasă
- e. garoul se aplică după puncția venoasă

Răspuns: a, d

366.*VSH-ul se determină din:

- a. sânge arterial
- b. sânge capilar
- c. sânge venos
- d. urina de dimineață
- e. urina colectată în 24 ore

Răspuns: c

367. *Valoarea normală a glicemiei este de:

- a. 80-110 mg %
- b. 41 ± 5 %
- c. 11-15 g%
- d. 12-17 mm/2 h
- e. 10-15 ‰

Răspuns: a

368. Hemocultura se recoltează:

- a. obligatoriu postprandial
- b. de regula înainte de administrarea antibioticelor
- c. obligatoriu à jeune (pe nemâncate)
- d. de regulă în plin frison sau puseu febril
- e. după masa de dimineață

Răspuns: b, d

369. Exudatul faringian se recoltează:

- a. postprandial
- b. de regulă dimineața

- c. înainte de administrarea antibioticelor
- d. de regulă în plin frison sau episod febril
- e. înainte ca bolnavul să bea, mănânce sau să se spele pe dinți

Răspuns: b, c, e

370. *Urocultura se recoltează din:

- a. urina colectată în decurs de 3 ore
- b. urina colectată dimineața di jetul mijlociu
- c. urina colectată à jeune
- d. urina colectată în 24 ore
- e. diureza pe 24 de ore

Răspuns: b

371. Medicamentele se administrează pe acea cale de administrare:

- a. utilizată și la alți bolnavi
- b. indicată de medicul curant
- c. menționată zilnic în fișa bolnavului
- d. solicitată de bolnav
- e. indicată de farmacistul spitalului

Răspuns: b, c

372. Ritmul de administrare al medicamentelor este:

- a. menționat zilnic în fișa bolnavului
- b. cel utilizat și de alți bolnavi
- c. indicat de farmacistul spitalului
- d. indicat de medicul curant
- e. cel solicitat de bolnav

Răspuns: a, d

373. Doza de medicamente administrată unui bolnav este:

- a. menționată zilnic în fișa bolnavului
- b. cea utilizată și la alți bolnavi
- c. menționată în rețeta prescrisă de medic
- d. indicată de medicul curant

e. cea solicitată de bolnav

Răspuns: a, c, d

374. *Pentru a-si pastra proprietatile insulina se păstrează:

- a. în dulapuri închise cu cheie
- b. în dulapuri uscate
- c. în farmacie
- d. în frigider
- e. în locuri ferite de lumină sau căldură

Răspuns: d

375.*Medicamentele injectabile se administrează:

- a. înainte de masă
- b. după masă
- c. imediat după preparare si/sau aspirarea în seringă
- d. per os
- e. imediat după ce au fost scoase din farmacie

Răspuns : c

376.*Medicamentele se administrează:

- a. în funcție de prescripția medicală (rețeta sau foaia de tratament)
- b. doar a jeune
- c. doar postprandial
- d. după 24 de ore de la extragerea din ambalajul original
- e. după 24 de ore de la eliberarea din farmacie

Răspuns: a

377. Asistentul medical trebuie să verifice înainte de administrarea unei doze:

- a. aspectul medicamentului
- b. integritatea ambalajului
- c. firma producătoare a medicamentului
- d. data fabricației

e. doza zilnică prescrisă

Răspuns: a, b, d, e

378. Scopul administrării medicamentelor poate fi:

- a. tratamentul simptomatic
- b. tratamentul profilactic
- c. tratamentul etiologic
- d. tratamentul patogenic
- e. explorator

Răspuns: a, b, c, d

379. Elementele care se urmăresc la monitorizarea funcției respiratorii sunt:

- a. frecvența respirațiilor pe minut
- b. amplitudinea mișcărilor respiratorii
- c. aspectul pulsului arterial
- d. oximetria
- e. simetria mișcărilor respiratorii

Răspuns: a, b, d, e

380.* Tulburările de micțiune sunt următoarele cu excepția:

- a. retenția acută de urină
- b. tulburări calitative ale urinei
- c. incontinența urinară
- d. retenția cronică de urină
- e. polakiuria și disuria

Răspuns: b

381. Caracterele calitative ale urinei sunt definite de:

- a. culoare
- b. miros
- c. aspect
- d. cantitate
- e. micțiune

Răspuns: a, b, c

382.Precizați dacă mișcările involuntare din afecțiunile descrise sunt corecte:

- a. tremor muscular ritmic în bolile cardiace
- b. tremuor muscular ritmic în boli renale
- c. convulsiile prezente în boli ale rinichiului
- d. convulsiile pot fi prezente în boli ale SNC
- e. tremorul muscular involuntar caracterizează Maladia Parkinson

Răspuns: d, e

404.Tuberculoza:

- a. este o boala infecto-contagioasă
- b. are răspândire în principal aeriană
- c. afectează cu predilecție plămânul
- d. se poate localiza și în alte țesuturi și organe
- e. nu este contagioasă

Răspuns : a, b, c, d

405.Transmiterea TBC se poate face prin :

- a. contact direct, prelungit cu bolnavul (intra familial)
- b. pe cale aeriană, prin picăturile lui Pflugge
- c. prin consum de lapte sau preparate din lapte contaminate, insuficient prelucrate termic (*Mycobacterium Bovis*)
- d. prin obiecte contaminate cu secreții (spută), provenite de la bolnavi cu leziuni deschise (rar).
- e. prin preparate de sânge contaminate

Răspuns : a, b, c, d

406.Durerea din angina pectorală stabilă:

- a. apare la efort
- b. cedează la repaus
- c. cedează rapid la nitroglicerină
- d. este localizată retrosternal

e. cedează la efort

Răspuns : a, b, c, d

407. Infecțiile tractului urinar la vârstnici:

- a. pot să fie afebrile
- b. pot să nu fie însoțite de tabloul clinic tipic
- c. pot fi sugerate de alterarea stării generale
- d. sunt însoțite de sindrom metabolic
- e. pot fi însoțite de anorexie, oboseală excesivă

Răspuns : a, b, c, e

408. Complicațiile osteoporozei sunt cu excepția:

- a. osteoartroza degenerativă
- b. dureri articulare
- c. tasări vertebrale
- d. fractura netraumatică
- e. tromboflebită

Răspuns : a, e

409. Eliminarea secrețiilor pulmonare este favorizată prin:

- a. Dieta
- b. Tuse și expectorație
- c. Aerosoli cu substanțe cu rol expectorant
- d. Drenaj postural legat de poziționarea bolnavului în pat
- e. Hidratarea corespunzătoare a bolnavului

Răspuns : b, c, d, e

410.* Oxigenul se administrează obligatoriu în caz de:

- a. scădere a hemoglobinei (anemie)
- b. creștere a hemoglobinei (poliglobulie)
- c. hipertermie
- d. scăderea saturației cu O_2
- e. deshidratare

Răspuns : d

411.* Cea mai frecvent agent implicat în boala diareică acută virală la copil este:

- a. adenovirusul
- b. rotavirusul
- c. pestivirusul
- d. astrovirusul
- e. parvovirusul

Răspuns: b

452. Antibioterapia se introduce în boala diareică acută în următoarele situații:

- a. diaree cu mucus
- b. diaree cu sânge
- c. stări de malnutriție
- d. sugar alimentat artificial
- e. sugar eutrofic, stare generală bună

Răspuns: a, b, c, d

453. Epiglotita acută se caracterizează prin:

- a. febră înaltă
- b. sialoree
- c. disfagie
- d. voce stinsă
- e. wheezing

Răspuns: a, b, c, d

454. Rinofaringita acută se manifestă la sugar prin:

- a. febră moderată
- b. obstrucție nazală
- c. wheezing
- d. agitație
- e. rinoree

Răspuns: a, b, d, e

455. Complicațiile Infecțiilor.Acute.Cai.Respiratorii .Superioare.
includ:

- a. otită
- b. sinuzită
- c. laringită
- d. traheobronșită
- e. edem alergic

Răspuns: a, b, c, d

456. Convulsiile febrile:

- a. apar în context febril
- b. la sugarul sub 6 luni
- c. au durată sub 15 minute
- d. nu asociază anomalii neurologice în perioada intercritică
- e. febra nu se datorează unei infecții a SNC

Răspuns: a, c, d, e

457.* Tratamentul crizei de convulsii febrile se face cu:

- a. Diazepam 0,3-0,5 mg/kg/zi
- b. Miofilin
- c. Fenobarbital 1-2 mg/kg/zi
- d. Aspirină 200 mg/kg/zi
- e. Paracetamol 100 mg/kg/zi

Răspuns: a

Răspuns: a, b, c, d

463.* Contraindicațiile alimentației naturale ce țin de factorul matern sunt:

- a. Insuficiența cardiacă
- b. Insuficiența renală
- c. Tuberculoza activă
- d. Infecția HIV
- e. Toate răspunsurile sunt corecte

Răspuns: e

468. * Alimentația mixtă se definește ca:

- a. introducerea sucului de fructe în alimentația sugarului
- b. administrarea de lapte de mamă și lapte de vacă la mese diferite
- c. administrarea de lapte de mamă și suc de fructe
- d. administrarea de lapte de vacă și suc de fructe
- e. administrarea de lapte praf și suc de fructe

Răspuns: b

469. Laptele de mamă are următoarele calități:

- a. alimentul ideal pentru creștere și dezvoltare
- b. ușor de administrat
- c. permite o dezvoltare neurosenzorială optimă
- d. temperatura optimă
- e. crește riscul pentru AB, HTA, diabet zaharat

Răspuns: a, b, c, d

470. Ce vaccinuri se pot efectua la sugar:

- a. antirujeolic
- b. anti virus imunodeficiența umană (anti HIV)
- c. antitetanos
- d. antipertusis
- e. antidifteric

Răspuns: a, c, d, e

493. Angina acută streptococică poate fi sugerată de următoarele semne clinice:

- a. hiperemie faringiană intensă cu microvezicule
- b. hiperemie faringiană intensă
- c. conjunctive hiperemice
- d. depozite pultacee
- e. adenopatie subangulomandibulară

Răspuns: b, d, e

494. Stomatita micotica:

- a. este determinata de candida albicans
- b. mucoasa bucala este cafenie
- c. depozitele de pe mucoasa sunt maronii
- d. depozitele sunt usor de inlaturat
- e. tentativa de inlaturare a depozitelor e urmata de sangerari

Răspuns: a, e

495. In diareea acuta a copilului mic se permit urmatoarele alimente:

- a. laptele de vaca
- b. smantana
- c. banana
- d. orez
- e. mazare

Răspuns: c, d

543. Testul PAP se caracterizează prin:

- a. are 5 clase
- b. stabilește singur diagnosticul de cancer de col uterin
- c. este urmat de alte investigații paraclinice dacă este anormal
- d. este o metodă de screening
- e. este foarte scump

Răspuns: a, c, d

544. Cauzele incontinenței urinare de efort sunt:

- a. multiparitatea
- b. rupturile perineale
- c. leucoreea
- d. fibromu uterin
- e. endometrioza

Răspuns: a, b

545. Forma gravă a vărsăturilor gravidice:

- a. cuprinde 3 faze, cu gravitate crescândă
- b. determină modificări metabolice
- c. poate duce la întreruperea terapeutică a sarcinii
- d. răsunetul asupra organismului matern este minor
- e. repausul fizic și psihic sunt suficiente

Răspuns: a, b, c

546. Pancreatita acută este caracterizată de?

- a. durere în bară în etajul abdominal superior
- b. creșterea amilazelor sangvine
- c. dureri intense hipogastrice
- d. scăderea amilazelor
- e. creșterea bilirubinei indirecte

Răspuns: a, b

578.* Semnul “cojii de portocală” este caracteristic pentru?

- a. tumorile benigne mamare
- b. inflamațiile acute mamare
- c. neoplasmul mamar cu extensie subtegumentară
- d. fibroadenomul mamar
- e. abcesul mamar cronic

Răspuns: c

579. Ginecomastia este?

- a. hipertrofia glandei mamare la femei în menopauză
- b. hipertrofia glandei mamare la fetițe
- c. hipertrofia glandei mamare la bărbați
- d. hipertrofia glandei mamare la femei gravide
- e. atrofia glandei mamare

Răspuns: c

580. Semnele clinice caracteristice pentru peritonite sunt ?

- a. greața

- b. apărarea musculară
- c. oprirea tranzitului
- d. contractura musculară
- e. distensia abdominală

Răspuns: b, d

581. Semnele clinice ale ocluziilor intestinale includ ?

- a. oprirea tranzitului intestinal pentru fecale și pentru gaze
- b. vărsături
- c. abdomen excavat
- d. dureri abdominale
- e. distensie abdominală

Răspuns: a, b, d, e

584.* Pneumoperitoneul apare la Rx abdominal pe gol în ?

- a. icter mecanic
- b. ulcer duodenal în puseu algic acut
- c. apendicită acută perforată
- d. ulcer gastric sau duodenal perforat
- e. ocluzie intestinală

Răspuns corect: d

585.* Nivelele hidroaerice apărute pe Rx-ul abdominal sunt caracteristice pentru ?

- a. peritonita
- b. pancreatita acută
- c. icter mecanic
- d. ocluzie intestinală
- e. gastroduodenită acută

Răspuns: d

586.* Varicele sunt?

- a. dilatații fusiforme ale venelor profunde
- b. dilatații și alungiri ale venelor superficiale ale membrului superior

- c. dilatații anevrismale, sacciforme ale venelor superficiale ale membrului inferior
- d. dilatații ale venelor jugulare

Răspuns corect: c

587.Apa oxigenată are efect:

- a. hemostatic
- b. oxidant
- c. virulicid
- d. bactericid
- e. fungicid

Răspuns: a, b, d

588.*Betadina nu este indicată la:

- a. spălătul mâinilor
- b. spălături vaginale
- c. spălături bucale
- d. toaleta plăgilor
- e. dezinfecție în general

Răspuns: e

589.Infecțiile nosocomiale se previn prin:

- a. spalarea mainilor
- b. evitarea supraaglomerării secției
- c. curățenie și dezinfecție zilnică și terminală
- d. evitarea toaletei zilnice la toți nou născuții
- e. alimentare corespunzătoare

Răspuns: a,b,c

590.Bioetica:

- a. cuprinde doar etica medicală tradițională
- b. se focalizează numai asupra omului
- c. cuprinde și biosfera în întregul ei

- d. cuprinde orice intervenție științifică a omului asupra vieții în general
- e. are 5 ramuri

Răspuns: c,

591.Etica Medicală:

- a. a fost doar apanajul Bisericii catolice
- b. a fost o preocupare și a celorlalte confesiuni religioase creștine
- c. nu a avut răsunet în lumea islamică
- d. face parte din tematica abordată în centrele de bioetică
- e. nu este relevantă pentru actul medical

Răspuns: b, d

592.Competența bioetică este recunoscută în:

- a. problemele etice ale profesiunilor sanitare
- b. problemele etice rezultate în cadrul cercetărilor pe om
- c. problemele sociale legate de problemele politicii sanitare și de medicina locurilor de muncă
- d. politici de planificare familială și control demografic
- e. probleme privind intervenția asupra vieții altor ființe vii decât omul

Răspuns: a, b, c, d, e

593.Finalitatea bioetică constă în:

- a. analiza rațională a problemelor morale legate de biomedicină
- b. conexiunea problemelor morale cu dreptul
- c. conexiunea problemelor morale cu științele sociale
- d. liniile etice nu au o finalitate aplicativă
- e. liniile etice au întotdeauna o finalitate aplicativă

Răspuns: a, b, c, e

594.In cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:

- a. beneficiile posibile pentru alții și pentru știință
- b. dosarele studiului vor putea fi vizualizate de către angajator
- c. obligația individului de a continua implicarea în studiu, odată ce a acceptat înrolarea
- d. pe cine să contacteze pentru întrebări în legătură cu cercetarea

- sau cu posibilitatea apariției unei lezări din cauza cercetării
- e. posibilele efecte nedorite ale terapiei cercetate

Răspuns: a, d, e

595.Principiile speciale ale transplantului de țesuturi și/sau organe sunt:

- a. să respecte demnitatea persoanei (donator, primitor, medic)
- b. să aibă scop terapeutic
- c. să respecte drepturile omului
- d. să nu fie determinat de oportunități politice sau economice
- e. poate avea scop pur științific

Răspuns: a, b, c, d

596.Donarea de organe trebuie să respecte o serie de principii:

- a. principiul respectării demnității umane
- b. principiul anonimatului donatorilor
- c. principiul gratuității
- d. principiul “primum non nocere”
- e. principiile se respecta doar pentru donator, nu și pentru primitor

Răspuns: a, b, c, d

597.Ce înseamnă „medicina genomică”?

- a. cunoașterea codului genetic al omului
- b. structura patrimoniului ereditar
- c. știința care studiază tipurile de sol
- d. posibilitatea cunoașterii constituției ereditare
- e. medicina care folosește cunoștințele legate de codul genetic uman

Răspuns: a, b, d, e

598.Eutanasia activa:

- a. este legala în România
- b. nu este legala în România
- c. este legala în unele state ale UE
- d. a fost legala în Statele Unite ale Americii
- e. înseamnă decuplarea unui bolnav comatos de la aparatele de susținere vitală

Răspuns: b, c, d

599.În cazul înrolării unui pacient într-un studiu de cercetare se vor explica:

- a. natura experimentală și scopul studiului
- b. faptul că participarea este voluntară
- c. procedura
- d. disconfortul și riscurile testelor atât pentru individ, cât și pentru familie
- e. sfatul genetic precizează exact dacă fatul va avea sau nu boala genetică

Răspuns: a, b, c, d

600.Zona zoster oftalmică:

- a. e produsă de virusul herpes simplex I
- b. poate să dea complicații oculare
- c. e însoțită de dureri frontale intense
- d. se caracterizează prin apariția de vezicule la nivelul tegumentului pleoapelor
- e. e produsă de virusul varicelo-zosterian

Răspuns: b, c, d, e

601.Atitudinea de urgență în cazul arsurilor oculare constă în:

- a. îndepărtarea resturilor de substanță sau corp străin
- b. spălătura largă cu apă sau ser fiziologic
- c. administrare generală de antibiotic
- d. nu ne atingem de ochi și pansăm
- e. administrare locală de cortizon

Răspuns: a, b, c

602.Regiunile patogenice în scabie?

- a. interdigital
- b. pliul axilar
- c. periombilical
- d. pielea păroasă a capului
- e. fața laterală a gambelor

Răspuns: a,b,c

603.Rolul nurselor în promovarea sănătății este în următoarele domenii:

- a. sănătate ocupațională
- b. educație și recuperare cardiacă
- c. educație civică
- d. educație juridică
- e. Interventia precoce

Răspuns: a,b,e

604.Intervențiile realizate de către nursă,pot fi :

- a. intervenții cognitive- educarea pacientului
- b. ntervenții psiho-sociale- mecanisme de adaptare, de suport, de reducere a stresului
- c. Interventii tehnice –proceduri de îngrijire a plagilor
- d. nu sunt necesare intervenții tehnice- proceduri de îngrijire a plăgilor, inserții de sonde
- e. nici una din afirmațiile de mai sus este adevărată

Răspuns: a,b,c

605. Simptomele accidentului vascular cerebral includ debutul brusc al:

- a. stări de amorțeală, slăbiciune sau paralizie a feței, brațului sau piciorului, de obicei pe o parte a corpului
- b. tranzit intestinal accelerat
- c. confuzie, tulburări de vorbire sau de înțelegere a cuvintelor celorlalți
- d. dureri de cap severe și tulburări severe la un ochi sau la ambii
- e. insomnii

Răspuns: a, c, d

606. Investigațiile necesare în depistarea accidentului vascular cerebral sunt:

- a. tomografia computerizată (CT)
- b. rezonanța magnetică (RMN)
- c. ecografia Doppler a arterelor carotide
- d. radiografie de craniu
- e. radiografia toracică

Răspuns: a, b, c